Antibiotikaverbrauch, Teil 2

Rationale Antibiotikatherapie in der hausärztlichen Versorgung

Professor Dr. med. Petra Gastmeier

Professor Dr. med. Jutta Bleidorn

Dr. med. **Florian Salm**

Dr. med. Tobias Kramer

Dr. med. Cornelius Remschmidt

Dr. med. Sandra Schneider

Dr. med. Miriam Wiese-Posselt

Institut für Hygiene und Umweltmedizin, Charité

Was Sie erwartet

■ Antibiotikaverbrauch

- Arztgruppen
- Patientengruppen
- Erkrankungen

Antibiotikaverbrauch

- Arztgruppen
- Patientengruppen
- Erkrankungen

Prozentuale Verteilung der AB-Verordnungen nach Fachgebiet

(deutschlandweite krankenkassenübergreifende Arzneiverordnungsdaten)

- Allgemeinmediziner / Hausärzte*
- Andere Fachärzte**
- Gynäkologen
- Hautärzte
- HNO-Ärzte
- Internisten, fachärztlich
- Kinder- und Jugendärzte
- nrb*** / unbekannt
- Psychiatrie / Neurologie****
- Urologen

- Antibiotikaverbrauch
- Arztgruppen
 - Patientengruppen
 - Erkrankungen

Durchschnittlich verordnete Antibiotikadosen pro Facharzt

(Verordnungsdaten für das Jahr 2014)

Tab. 2.1.4: Antibiotikaverordnungsvolumen pro Arzt bestimmter Facharztgruppen für 2014 (Quelle: WIdO).

Facharztgruppe	Verordnete Antibiotika-DDD pro Facharzt
HNO-Ärzte	5.563
Kinderärzte	5.533
Urologen	5.309
Hautärzte	5.243
Hausärzte	5.003
Alle Ärzte	2.186

Antibiotikaverbrauch

- Arztgruppen
- Patientengruppen
- Erkrankungen

Ambulante Antibiotikaverordnungen in Deutschland, 2010-2018

(Verordnungen pro 1.000 GKV-Versicherte und Jahr)

Holstiege et al. Versorgungsatlas 2019

Antibiotikaverordnungen bei Atemwegsinfektionen

(Verordnungsdaten für das Jahr 2009)

Antibiotikaverbrauch

- Arztgruppen
- Patientengruppen
- Erkrankungen

Antibiotikaverordnungen bei Atemwegsinfektionen

(Verordnungsdaten für das Jahr 2009)

Antibiotikaverbrauch

- Arztgruppen
- Patientengruppen
- Erkrankungen

Abbildung E2: Anteiliger Einsatz verschiedener Antibiotikawirkstoffgruppen bei Patienten mit der Diagnose Atemwegsinfektionen nach KV-Bereichen (nur Erstverordnungen)

Rote Hand-Brief Fluorchinolone

Antibiotikaverbrauch

- Arztgruppen
- Patientengruppen
- **Erkrankungen**

08.04.2019

Wichtige Arzneimittelinformation

Systemisch und inhalativ angewendete Chinolon- und Fluorchinolon-Antibiotika: Risiko von die Lebensqualität beeinträchtigenden, lang anhaltenden und möglicherweise irreversiblen Nebenwirkungen - Anwendungsbeschränkungen

Rote-Hand-Brief 2019

Antibiotikaverbrauch

- Arztgruppen
- Patientengruppen
- **Erkrankungen**

Verschreiben Sie Fluorchinolone **nicht**

- zur Behandlung von nicht schweren oder selbstlimitierenden Infektionen (wie Pharyngitis, Tonsillitis und akuter Bronchitis).
- zur Prävention von Reisediarrhoe oder rezidivierenden Infektionen der unteren Harnwege.
- für nicht-bakterielle Infektionen, z.B. nicht-bakterielle (chronische) Prostatitis
- bei leichten bis mittelschweren Infektionen (einschließlich unkomplizierter Zystitis, akuter Exazerbation einer chronischen Bronchitis und chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD), akuter bakterieller Rhinosinusitis und akuter Otitis media), es sei denn, andere Antibiotika, die üblicherweise für diese Infektionen empfohlen werden, werden als ungeeignet erachtet.
- Patienten, die zuvor schwerwiegende Nebenwirkungen mit einem Chinolon- oder Fluorchinolon-Antibiotikum hatten.

Rote-Hand-Brief 2019

■ Hintergrund: mögliche Schwerwiegende Nebenwirkungen des Bewegungsapparates und des ZNS, teilweise irreversibel

- Sehnenruptur
- Muskelschwäche
- Periphere Neuropathie
- Depression
- Seh-, Hör-, Geruchs- und Geschmacksstörungen

Antibiotikaverbrauch

- Arztgruppen
- Patientengruppen
- **Erkrankungen**